

Resumen del reglamento de vacunas obligatorias para la escuela 2010-2011

Grupo de edad del estudiante	Vacunas obligatorias
Menores de 2 a 5 años inscritos en programa de escuela sin licencia para proveer cuidado infantil	<p>4 dosis de una de las siguientes vacunas: DTaP (contra la difteria, el tétano y la tos ferina), DTP, o DT</p> <p>3 dosis de la vacuna contra la Polio,</p> <p>3 dosis de la vacuna Hib (<i>anti-Haemophilus influenzae</i>) o 1 dosis de la vacuna Hib puesta a los 15 meses de edad o después,</p> <p>3 dosis de la vacuna pediátrica contra la Hepatitis B,</p> <p>1 dosis de la vacuna MMR (contra el sarampión, la parotiditis urliana y la rubéola) o MMRV (contra el sarampión, la parotiditis urliana, la rubéola y la varicela) puesta a los 12 meses de edad o después,</p> <p>1 dosis de la vacuna contra la varicela (<i>chickenpox</i>) o de la vacuna MMRV puesta a los 12 meses de edad. Se acepta documentación escrita (incluyendo el año) de la enfermedad (varicela) de parte del padre de familia, tutor o proveedor de salud.</p>
Estudiantes quienes entran a la escuela por primera vez (Kínder o Primer Grado)	<p>3 dosis de una de las siguientes vacunas: DTaP, DTP, DT o Td (tétano), una de las cuales debe de haber sido puesta a los 4 años de edad,</p> <p>3 dosis de la vacuna contra la Polio,</p>
Estudiantes quienes entran al Séptimo Grado	<p>3 dosis de la vacuna pediátrica contra la Hepatitis B o 2 dosis de la vacuna para adolescentes si el estudiante tiene de 11 a 15 años de edad</p> <p>2 dosis de la vacuna MMR o MMRV, puesta a los 12 meses de edad o después y con diferencia de al menos un mes,</p> <p>Únicamente para estudiantes de Séptimo Grado – 1 dosis de la vacuna Tdap (debe contener vacuna de refuerzo contra la pertussis) – esta dosis puede haber sido puesta en cualquier momento después de los 10 o 11 años dependiendo de la marca de la vacuna</p>
Estudiantes de otros estados fuera de Nebraska, sin importar el grado (incluye estudiantes de otros países)	<p>1 dosis de la vacuna contra la varicela (<i>chickenpox</i>) o de la vacuna MMRV puesta a los 12 meses de edad o después y antes de los 13 años. Si se ha puesto a los 13 años o después, 2 dosis de varicela (y no de MMRV), con al menos un mes de diferencia. . Se acepta documentación escrita (incluyendo el año) de la enfermedad (varicela) de parte del padre de familia, tutor o proveedor de salud.</p>
El resto de estudiantes quienes no han sido mencionados anteriormente (estudiantes de primer grado hasta sexto grado y de octavo grado a doceavo grado)	<p>3 dosis de una de las siguientes vacunas: DTaP, DTP, DT o Td, una de las cuales debe de haber sido puesta a los 4 años de edad o después,</p> <p>3 dosis de la vacuna contra la Polio,</p> <p>3 dosis de la vacuna pediátrica contra la Hepatitis B o 2 dosis de la vacuna para adolescentes si el estudiante tiene de 11 a 15 años de edad</p> <p>2 dosis de la vacuna MMR o MMRV, puesta a los 12 meses o después y con diferencia de al menos un mes,</p> <p>1 dosis de la vacuna contra la varicela (<i>chickenpox</i>) o de la vacuna MMRV puesta a los 12 meses de edad o después y antes de los 13 años. Si se ha puesto a los 13 años o después, 2 dosis de varicela (y no de MMRV), con al menos un mes de diferencia. . Se acepta documentación escrita (incluyendo el año) de la enfermedad (varicela) de parte del padre de familia, tutor o proveedor de salud.</p>